

# USG JAMY BRZUSZNEJ DOROŚLI

## ZALECENIA PRZED BADANIEM

Dwa dni przed badaniem pacjent powinien unikać spożywania potraw wzdymających i ciężkostrawnych.

Badanie zazwyczaj wykonuje się rano, na czczo; w przeciwnym wypadku zalecane jest wstrzymanie się od przyjmowania pokarmów stałych i napojów gazowanych przez 6 godzin przed badaniem.

Rekomenduje się przyjmowanie środków farmakologicznych zmniejszających objętość gazów w przewodzie pokarmowym (np. Espumisan).

Pacjent powinien mieć pełny pęcherz moczowy.

1. w dniu badania nie palić papierosów, nie żuć gumy, nie ssać cukierków;
2. przedstawić poprzednie wyniki badań USG;
3. ważna legitymacja ubezpieczeniowa;
4. dowód osobisty.

## **WSzZ w Lesznie Zakład RTG**

**tel. 65 525 32 60**

## **USG JAMA BRZUSZNA DZIECI**

Badane dziecko powinno mieć pełny pęcherz, dlatego 30–60 minut przed badaniem należy mu podać niegazowany płyn. Noworodki bada się po nakarmieniu przez matkę.

Nie jest wymagane badanie na czczo, chyba że diagnozowana patologia dotyczy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. W tych przypadkach wystarczające jest 3-godzinne powstrzymanie się od posiłku.

## **USG AORTY I TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH**

Ponieważ część badania dotyczy struktur naczyniowych umiejscowionych w obrębie jamy brzusznej, pacjent podlega regułom stosowanym przy tego typu badaniu: nie powinien spożywać posiłków i napojów (szczególnie gazowanych) przez co najmniej 6 godzin przed badaniem, w dniu poprzedzającym musi ograniczyć pokarmy powodujące wzdęcia (surowe warzywa, owoce, słodkie, czerstwe pieczywo), a także powstrzymać się od palenia papierosów przez 6 godzin przed badaniem. Osoby z większą nadwagą mogą przyjmować preparaty zmniejszające ilość gazów w jelitach.